

子葉がしほんで、本葉が2~3枚になら植え付ける。

3号ポット(直径9cm)に3粒まき、発芽がそろったら2本に間引く。

鳥の被害が心配なら、ポットで育苗しない場合は背が低いつるなし種を選ぶといいでしょ。株間は30cm程度あけます。収穫期間は短いですが、種まきから収穫までは早く、1~1.5ヶ月ほどです。土がねねて汚れやすいのでマルチを張りましょう。本葉が3枚くらいになって子葉がしほんだら植え付けます。

## 育 苗

畠が狭い場合や支柱やネットを張りたくない場合は背が低いつるなし種を選ぶといいでしょ。株間は30cm程度あけます。収穫期間は短いですが、種まきから収穫までは早く、1~1.5ヶ月ほどです。土がねねて汚れやすいのでマルチを張りましょう。

## 支柱立て

ツルが倒れないで、支柱や竹の枝などを立てておくだけでも良いですが、ツルが複雑に絡み合い収穫しにくくなります。キュウリ用のネットを張つておくと広がって絡んでき、難もよく当たります。

## 収 穫

種類によりますが、インゲンの長さが13~15cmになつたら収穫です。取り遅れると硬くなってしまうのであまり大きくならないうちに収穫しましょう。ほぼ毎日収穫できるようになります。

種まき時期が長いので、10日~2週間ほどずらして何度かに分けてまくと、最初の株が終わっても継続して収穫することができます。



## 摘心・追肥

葉が5枚出たところで芯を摘むとわき芽が多く出て収量が増えます。そのため追肥をして土寄せします。2回目の追肥は盛んに収穫をしている頃に行います。



生育中に乾燥してしまふよ

## ●オススメ資材● 「草退治Z」

「草退治Z」 1,060円(税込)(900g)  
2,040円(税込)(2kg)  
3,200円(税込)(3kg)



駐車場や宅地等で使用する除草剤です。

イネ科雑草もしっかり枯らし、約6カ月効果が持続!

○お求め・お問い合わせは、グリーンファーム各店までお気軽にどうぞ。



第  
179回  
今月は

# ほうさくClub!

気軽に家庭菜園



## 「つるありインゲン」 に挑戦!

★これがつるありインゲンのスケジュールだよ。Calendar

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
播まき			収穫								

●施肥基準  
(1mあたり一例)

■苦土石灰150g ■堆肥1kg ■BBN552号80g  
■9B追肥N30号30g×2回

⚠ 文中の肥料等は一例です。地区によっては違う種類で対応している場合もあります。不明な点は、営農技術員にお問い合わせください。

世界中でよく食べられているマメ類の一つで、品種は数百もあるといわれています。中央アメリカ原産で、当地では主要作物とされています。コロシフスクをヨーロッパに持ち込み、マメだけでなく若いサヤと食べる方法もヨーロッパで流行りました。17世紀に明から招いた鶴元禪師が日本に広めたのは明治時代にヨーロッパから品種を導入してからです。

日本で広めたのは明治時代にヨーロッパに持ったとあるといわれています。中央アメリカ原産で、当地では主要作物とされています。コロシフスクをヨーロッパに持ち込み、マメだけでなく若いサヤと食べる方法もヨーロッパで流行りました。17世紀に明から招いた鶴元禪師が日本に広めたのは明治時代にヨーロッパから品種を導入してからです。


マメ科は連作を嫌うので、前作がマメ科ではなかった土地を選ばとよいでしょう。種まきの2週間前に苦土石灰と堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかなくなるので、堆肥を、1週間前に化成肥料をまじてよく耕しておきます。マメ科は窒素肥料が多いとツルだけが伸びて実がつかなくなるので、耕すとよいです。ツルだけが伸びて実がつかくなるので、耕すとよいです。



鳥害防止  
不織布



鳥害を防ぐには、種まき後に不織布などをベタ掛けする。本葉が出始め、子葉がしほむ頃まで不織布はかけておく。



BBN552号  
苦土石灰

堆肥

播まき  
施肥

施肥

施肥

施肥

施肥

施肥

施肥

施肥

施肥

り押さえて抜か、ハサミで切り取ります。