



ポイント

防虫ネットを外した後は、アブラムシなどの害虫に対して、より一層注意が必要になります。アブラムシやアザミウマが媒介するウイルス病は、葉や実が奇形になり、治ることはありません。効果がある農薬もなく、発病したら株ごと抜き取るようになってしまいます。病気の株の汁が付いた収穫用の刃物からも移ることがあるので気を付けましょう。



管理

奇形果が出やすくなるので、わき芽が出てきたらかき取りましょう。茎は支柱を立てて上に伸ばすこともできますが、重くなるため茎が折れるリスクも高まります。風の向きに逆らわず、自然に寝かせて育てる方が折れる心配は少なくなります。黄色くなった葉は、葉の部分だけ摘み取りましょう。葉柄は残しておいた方が茎が折れにくくなります。株が成長して大きくなったら防虫ネットを外します。定植後1カ月くらいが目安です。



雄花を摘み取ってから花びらを取り去り、雌花の柱頭に転がすように付ける

受粉しないと実が腐ります。本来ミツバチなどが受粉を手伝って実が大きくなるのですが、確実に実らせるには人工授粉が良いでしょう。遅くとも朝9時までに、咲いている雄花を摘み取り花びらを取って、雌花の中心にあるめしべに花粉を軽くこすり付けてやりま

収穫

受粉が成功すれば、5日程度で果実が20cmくらいに育ちます。カッターやハサミで付け根を切り取って収穫しますが、雨の日は切り口から病原菌が入りやすいので注意しましょう。また、実が育っている間にしぼんだ花からは取り除いた方が、実がかびる心配がありません。1株だけでも育てられますが、雌花と雄花が同じ日に咲かないと受粉しにくいので、数株一緒に育てた方がたくさん収穫できます。また、雌花だけで雄花が咲いていないのなら、花ズッキーニとして収穫してその日のうちに食べるのも、家庭菜園ならではの収穫方法です。



ほうさくClub!



第225回 今月は

「ズッキーニ」に挑戦!

★これがズッキーニのスケジュールだよ。Calendar

Calendar table showing months from 1月 to 12月 with indicators for '定植' (planting) and '収穫' (harvest).

- 施肥基準 (1㎡あたり・一例)
■苦土石灰100g ■堆肥3kg ■BBN552号80g
■BB追肥N30号20g×2

文中の肥料等は一例です。地区によっては違う種類で対応している場合もあります。不明な点は、営農技術員にお問い合わせください。



畑の準備・定植

定植の2週間前に苦土石灰と堆肥を、1週間前に化成肥料をまいて耕します。幅90cm、高さ15cm程度のうねを作り、マルチを張りま

ズッキーニの生産量日本は長野県。当JAでも出荷品目です。新しい野菜だけと身近な野菜です。北アメリカやメキシコが原産ですが、16世紀ごろヨーロッパに渡り栽培されてきました。日本には1980年代に入っています。見た目はキュウリのようにですが、カボチャの仲間です。ズッキーニという名前は、イタリア語の「小さいカボチャ」が語源になっています。

おすすめ資材

苗ドーム 小サイズ(直径約30cm、高さ約22cm)5セット入り 815円(税込)

苗の上から被せるだけ!怖い遅霜もこれで安心です。防鳥、保温もできる!固定用の針金も付いていて便利!支柱保持穴があるので、支柱を立てている場合でも被せることができます。大サイズ(直径約35cm、高さ約24cm)、特大サイズ(直径約40cm、高さ約33cm)もあります。

○お求め・お問い合わせは、グリーンファーム各店までどうぞ。



ほうさくClub!に関するお問い合わせは、各グリーンファーム店まで

- ◎中央店 ☎29-8177 ◎東部店 ☎62-0665 ◎西部店 ☎22-4091
◎さなだ店 ☎72-8072 ◎まるこ店 ☎42-2977 ◎よだくぼ南部店 ☎85-2400
◎しおだ店 ☎39-8118

